Liebe Patientin,
lieber Patient,

Ihr Arzt hat Ihnen zur Behandlung Ihrer Erkrankung CML (Chronische Myeloische Leukämie) den Tyrosinkinaseinhibitor, imatinib axios, verordnet. Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen und Ihren Angehörigen die wichtigsten Informationen zu Einnahmemöglichkeiten und Nebenwirkungen von imatinib axios.

Damit die Menge des Wirkstoffes im Blut den ganzen Tag über möglichst gleich bleibt, ist es wichtig, dass Sie Ihr Medikament in regelmäßigen Abständen einnehmen. Wirken Sie bei Ihrer Therapie nach besten Möglichkeiten mit und achten Sie auf die konsequente Einnahme.

WIE NEHME ICH imatinib axios EIN?

- Nehmen Sie imatinib axios mit einer Mahlzeit ein. Dies kann Magenbeschwerden vorbeugen.
- Schlucken Sie die Kapseln im Ganzen und trinken Sie dazu ein großes Glas Wasser. Öffnen oder zerdrücken Sie die Kapseln nicht, es sei denn, Sie haben Schwierigkeiten mit dem Schlucken (z. B. Kinder).
- Wenn Sie oder Ihr Kind nicht in der Lage sind, die Kapseln zu schlucken, können Sie diese öffnen und das Pulver in ein Glas Wasser ohne Kohlensäure oder Apfelsaft geben.

EINNAHMEEMPFEHLUNG FÜR PATIENTEN MIT SCHLUCKSCHWIERIGKEITEN

1. Kapsel über einem großen Glas mit stillem Wasser oder Apfelsaft auseinanderziehen.

2. Kapselinhalt ins Glas geben, mit einem Löffel umrühren und sofort einnehmen.

WAS MACHE ICH, WENN ICH ...

... das Medikament vergessen habe?

Nehmen Sie die fehlende Dosis sobald Sie sich daran erinnern. Falls die Einnahme der nächsten Dosis unmittelbar bevor steht, lassen Sie die vergessene Dosis aus. Dann fahren Sie mit Ihrem normalen Einnahmeschema fort. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, um eine vergessene Dosis auszugleichen.

... eine größere Menge eingenommen habe, als ich sollte?

Sprechen Sie bitte unverzüglich mit Ihrem Arzt, wenn Sie unbeabsichtigt zu viele Kapseln eingenommen haben. Es kann sein, dass Sie eine medizinische Beobachtung benötigen.

NEBENWIRKUNGEN

Sollte Ihr Wohlbefinden unter der Therapie beeinträchtigt sein, oder sollten Sie Nebenwirkungen spüren, zögern Sie nicht, Ihren Arzt darüber zu informieren.

SEHR HÄUFIGE NEBENWIRKUNGEN

- Rasche Gewichtszunahme durch Wassereinlagerungen
- Infektionen
- Kopfschmerzen oder Müdigkeit
- Muskelkrämpfe
- Durchfall
- Juckreiz, Hautausschlag
- Übelkeit und Erbrechen
- Blutungen oder blaue Flecken

Weitere Nebenwirkungen finden Sie in der Packungsbeilage.

WANN MUSS ICH DAS MEDIZINISCHE FACHPERSONAL INFORMIEREN?

- Wenn sich der Durchfall mit der Normaldosierung des Wirkstoffs Loperamid (z. B. Imodium®) mit bis max. 8 Kapseln/Tabletten pro Tag nicht stoppen lässt.
- Bei Auftreten von Fieber über 38 °C.
- Wenn eine Hautveränderung (Ausschlag, Rötung, Juckreiz) auftritt.
- Wenn Sie unter anhaltenden oder anderen unklaren Beschwerden leiden.

axionovo GMBH

IHR SCHLÜSSEL ZUM THERAPIEERFOLG.

EINNAHMETREUE.

PATIENTENINFORMATION ZUR CML-THERAPIE

WAS MUSS ICH SONST NOCH WISSEN?

- Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, einschließlich nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel (z.B. Paracetamol) und pflanzlicher Arzneimittel (z. B. Johanniskraut).
- Folgende Produkte können die Wirkung des Medikamentes stören: Grapefruit-, Johanniskraut-Präparate. Verzichten Sie deshalb während der Behandlung auf diese Produkte.
- Einige Arzneimittel können die Wirkung von imatinib axios beeinflussen, wenn sie zusammen eingenommen werden. Sie können die Wirkung von imatinib axios verstärken oder vermindern, was entweder zu verstärkten Nebenwirkungen führen kann oder dazu, dass imatinib axios weniger wirkt.
- Unterbrechen Sie die Behandlung **nicht** ohne Rücksprache mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt.

AxioNovo GmbH · Kammerichstraße 39 · 33647 Bielefeld
Tel.: +49 521 988 35 0 · Fax.: +49 521 988 35 18
info@axionovo.de · www.axionovo.de