

## WANN MUSS ICH DAS MEDIZINISCHE FACHPERSONAL INFORMIEREN?

- Wenn sich Durchfall mit der Normaldosierung des Wirkstoffs Loperamid (z. B. Imodium®) mit bis max. 8 Kapseln/Tabletten pro Tag nicht stoppen lässt.
- Bei Auftreten von Fieber über 38 °C.
- Wenn eine Hautveränderung (Ausschlag, Rötung, Juckreiz) auftritt.
- Wenn Sie unter anhaltenden oder anderen unklaren Beschwerden leiden.

## NEBENWIRKUNGEN

Sollte Ihr Wohlbefinden unter der Therapie beeinträchtigt sein, oder sollten Sie Nebenwirkungen spüren, zögern Sie nicht, Ihren Arzt darüber zu informieren.

## SEHR HÄUFIGE NEBENWIRKUNGEN

- rasche Gewichtszunahme, z. B. durch Wassereinlagerungen
- Infektionen
- unerwartete Blutungen oder blaue Flecken
- Kopfschmerzen oder Müdigkeit
- Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Verdauungsstörungen
- Hautausschlag
- Muskelkrämpfe oder Gelenk-, Muskel- oder Knochenschmerzen
- Gelenkschwellungen oder geschwollene Augen

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage zur Information weiterer Nebenwirkungen.

### imatinib axios 200 mg Hartkapseln

**Wirkstoff:** Imatinib (als Mesilat). Enthält Lactose. **Anwendungsgebiete:** Erwachsene u. Kinder mit neu diagnostizierter Philadelphia-Chromosom (bcr-abl)-positiver (Ph+) chronischer myeloischer Leukämie (CML). Erwachsene u. Kinder mit Ph+ CML in der chronischen Phase nach Versagen einer Interferon-Alpha-Therapie, in der akzelerierten Phase o. in der Blastenkrise. Erwachsene u. Kinder mit neu diagnostizierter Philadelphia-Chromosom-positiver akuter lymphatischer Leukämie (Ph+ ALL) in Kombination mit einer Chemotherapie. Erwachsene mit rezidivierender o. refraktärer Ph+ ALL als Monotherapie. Erwachsene mit myelodysplastischen/myeloproliferativen Erkrankungen (MDS/MPD) in Verbindung mit Genumlagerungen des PDGF-Rezeptors. Erwachsene mit fortgeschrittenem hypereosinophilem Syndrom (HES) u./o. chronischer eosinophiler Leukämie (CEL) mit FIP1L1-PDGFR $\alpha$ -Umlagerung. Behandlung c-Kit-(CD117)-positiver nicht resezierbarer u./o. metastasierter maligner gastrointestinaler Stromatumoren (GIST) bei Erwachsenen. Adjuvante Behandlung Erwachsener mit signifikantem Risiko eines Rezidivs nach Resektion c-Kit-(CD117)-positiver GIST. Erwachsene mit nicht resezierbarem Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) und Erwachsene mit rezidivierendem u./o. metastasiertem DFSP, die für eine chirurgische Behandlung nicht in Frage kommen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff o. einen der sonstigen Bestandteile. Während der Schwangerschaft. Kein Stillen unter Imatinib-Behandlung und 15 Tage danach. **Ausführliche Informationen** u.A. zu Nebenwirkungen siehe Gebrauchsinformation oder fragen Sie Ihren Arzt. *Viele der aufgeführten Nebenwirkungen können im Zusammenhang mit der Grunderkrankung stehen. Verschreibungspflichtig.* Stand: September 2021 AxioNovo GmbH

AxioNovo GmbH · Kammerichstraße 39 · 33647 Bielefeld

Tel.: +49 521 98835 - 0 · Fax: +49 521 98835 - 18 · info@axionovo.de · www.axionovo.de

axionovo  
G M B H

Ihr Schlüssel zum Therapieerfolg.  
EINNAHMETREUE.

Patienteninformation zur Therapie mit  
imatinib axios

## Liebe Patientin, lieber Patient,

Ihr Arzt hat Ihnen zur Behandlung Ihrer Erkrankung, wie z. B. CML (Chronische Myeloische Leukämie), ALL (Akute Lymphatische Leukämie) oder gastrointestinale Stromatumoren (GIST), den Tyrosinkinaseinhibitor **imatinib axios** verordnet. Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie und Ihre Angehörigen zu Einnahmemöglichkeiten und Nebenwirkungen von **imatinib axios**.

Damit die Menge des Wirkstoffes im Blut den ganzen Tag über möglichst gleich bleibt, ist es wichtig, dass Sie Ihr Medikament in regelmäßigen Abständen einnehmen. Wirken Sie bei Ihrer Therapie nach besten Möglichkeiten mit und achten Sie auf die konsequente Einnahme.

Installieren Sie eine Medikamenten-Erinnerungs-App auf Ihrem Handy, sodass Sie an die regelmäßige Einnahme erinnert werden.

## WAS MUSS ICH WISSEN?

- Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, einschließlich nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel (z. B. Paracetamol) und pflanzlicher Arzneimittel (z. B. Johanniskraut).
- Einige Arzneimittel können die Wirkung von **imatinib axios** beeinflussen, wenn sie zusammen eingenommen werden. Sie können die Wirkung von **imatinib axios** verstärken oder vermindern, was entweder zu verstärkten Nebenwirkungen führen kann oder dazu, dass **imatinib axios** weniger wirkt.
- Unterbrechen Sie die Behandlung nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Scheuen Sie sich nicht Ihren Arzt anzusprechen. Fragen Sie solange, bis Sie sich ausreichend informiert fühlen.

## WIE NEHME ICH imatinib axios EIN?

- Nehmen Sie **imatinib axios** mit einer Mahlzeit ein. Dies kann Magenbeschwerden vorbeugen.
- Schlucken Sie die Kapseln im Ganzen und trinken Sie dazu ein großes Glas Wasser. Öffnen oder zerdrücken Sie die Kapseln nicht, es sei denn, Sie haben Schwierigkeiten mit dem Schlucken (z. B. Kinder).
- Wenn Sie oder Ihr Kind nicht in der Lage sind, die Kapseln zu schlucken, können Sie diese öffnen und das Pulver in ein Glas Wasser ohne Kohlensäure oder Apfelsaft geben.
- Wenn Sie schwanger sind, oder schwanger werden können, sollten Sie mit dem Inhalt der Kapsel vorsichtig umgehen, um Kontakt mit Haut oder Augen oder das Einatmen des Pulvers zu vermeiden. Waschen Sie unmittelbar danach Ihre Hände.

## EINNAHMEEMPFEHLUNG FÜR PATIENTEN MIT SCHLUCKSCHWIERIGKEITEN



1. Kapsel über einem großen Glas mit stillem Wasser oder Apfelsaft auseinanderziehen.



2. Kapselinhalt ins Glas geben, mit einem Löffel umrühren und sofort einnehmen.